

Danuta Seroka

BRUCELOZA W 1993 ROKU

W roku 1993 zarejestrowano w formularzach Mz-56 Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 58 przypadków brucelozy ludzi zgłoszonych w ramach prowadzonego przez Służbę Sanitarną nadzoru nad zawodowym narażeniem na zakażenie *Brucella abortus bovis* (tab. I).

Dane niezbędne dla epidemiologicznej charakterystyki tego problemu zawierają tabele II i III.

Tabela I. Rejestracja zachorowań ludzi na brucelozę w Polsce w 1993 (formularz Mz-56).

Województwo	Liczba zachorowań w kwartale:				Razem
	I	II	III	IV	
bydgoskie	1	0	2	0	3
gdańskie	1	0	0	0	1
gorzowskie	3	0	1	3	7
elbląskie	0	0	0	1	1
jeleniogórskie	0	0	1	0	1
konińskie	0	1	0	1	2
legnickie	3	3	4	1	11
piotrkowskie	1	0	0	0	1
płockie	0	1	0	0	1
poznańskie	1	2	2	3	8
skierniewickie	1	0	0	0	1
szczecińskie	1	0	0	0	1
toruńskie	0	0	1	2	3
wrocławskie	1	0	0	0	1
zielonogórskie	5	4	4	3	16
Razem	18	11	15	14	58

Informacje te potwierdzają wcześniejsze wnioski, że rejestracja przypadków brucelozy w Polsce posiada charakter nadzoru nad chorobą zawodową i stanowi ocenę chorobowości nie zaś zapadalności nad brucelozę.

Na tej podstawie Komisja Epidemiologiczna Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, na posiedzeniu w dniu 9 maja 1994 r. podjęła decyzję o zaniechaniu masowych przeglądów serologicznych w kierunku brucelozy. Decyzja powyższa nie może mieć żadnego wpływu na dostępność do laboratoryjnych i klinicznych badań w kierunku brucelozy osób z przewlekłą brucelozą nabytą w okresie epizootii tej choroby jak również w każdym przypadku podejrzenia o zachorowanie na brucelozę.

Tabela II. Przypadki brucelozy ludzi zarejestrowane w Polsce w 1993 r. według zawodu, płci i stażu pracy

Grupy zawodowe	Płeć	Liczba osób o stażu pracy powyżej 10 lat	Łączna liczba zarejestrowanych przypadków (M + K)
Pracownicy służby weterynaryjnej	M	23	23
Pracownicy obsługi zwierząt	M	9	11
	K	2	
Inseminatorzy	M	2	2
Pracownicy zakładów mięsnych	M	11	13
	K	2	
Rolnicy	M	3	6
	K	1	
Inne	M	3	3
Łącznie		56	58

M – mężczyźni

K – kobiety

Tabela III. Immunologiczne podstawy rozpoznawania brucelozy u ludzi w Polsce w 1993 r.

Grupy uzyskanych wyników	Wyniki badań	Liczba zbadanych osób
I	A (-) OWD (-)	23
	A (-) OWD (-) B (+)	28
	A (-) OWD (-) C (+)	3
	Łącznie	54
II	A (±) OWD (-)	2
	A (±) OWD (-) B (+)	1
	A (±) OWD (-) B (+) C (+)	1
	Łącznie	4

A – odczyn zlepnny (+) dodatni
 OWD – odczyn wiązania dopełniacza (-) ujemny
 B – odczyn Burneta (±) wątpliwy
 C – odczyn Coombsa

Nadzór epidemiologiczny nad brucelozą powinien polegać na szybkim objęciu badaniem i leczeniem osób narażonych w ognisku brucelozy zwierząt.

Zasady informacji Służby Sanitarnej przez Służbę Weterynaryjną o podejrzeniu lub stwierdzeniu brucelozy u zwierząt i wspólne opracowanie ogniska reguluje Zarządzenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministerstwa Rolnictwa z dnia 24 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski nr 34, poz. 152).