

Halina Rudnicka

## RÓŻYCZKA W 1994 ROKU\*

W 1994 roku nastąpił w Polsce, w porównaniu z rokiem ubiegłym, dalszy spadek liczby zachorowań na różyczkę. Zarejestrowano 52 703 przypadki a zapadalność wyniosła 136,7 na 100 000 (tab. I). Najwyższą zapadalność zanotowano w województwie wrocławskim (573,1) oraz śląskim (405,6). Wysoką zapadalność (powyżej 200 na 100 000) wykazały też województwa: bydgoskie, krośnieńskie, łódzkie, radomskie, rzeszowskie, szczecińskie i toruńskie. Najniższą zapadalność (27,7 na 100 000) miało województwo łomżyńskie.

Tabela I. Różyczka w Polsce w latach 1988-1994.

Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców wg województw.

Województwo	Mediana 1988-1992		1993		1994	
	l. zach.	zapad.	l. zach.	zapad.	l. zach.	zapad.
1	2	3	4	5	6	7
Polska	20663	54,4	64043	166,5	52703	136,7
1. St. warszawskie	2028	83,9	879	36,5	1351	56,0
2. Białkopodlaskie	172	56,4	108	35,0	159	51,4
3. Białostockie	303	44,4	4399	629,8	629	89,9
4. Bielskie	419	46,7	2523	277,4	947	103,7
5. Bydgoskie	410	36,9	3507	311,8	2953	261,9
6. Chełmskie	76	30,7	67	26,9	159	63,7
7. Ciechanowskie	232	54,2	409	94,1	190	43,7
8. Częstochowskie	447	57,6	1258	160,9	1492	190,8
9. Elbląskie	282	58,7	2202	451,8	571	116,7
10. Gdańskie	400	29,3	3174	220,3	1696	117,1
11. Gorzowskie	230	46,3	1149	226,6	301	59,2
12. Jeleniogórskie	378	73,5	244	46,7	522	99,7
13. Kaliskie	238	33,8	439	61,1	660	91,6
14. Katowickie	2343	59,2	5475	138,4	3797	96,0
15. Kieleckie	578	51,4	2460	216,6	1827	160,9
16. Konińskie	130	27,8	896	188,2	176	36,8
17. Koszalińskie	262	51,7	1129	219,0	944	182,1
18. M. krakowskie	1092	88,6	1660	134,6	2470	199,7
19. Krośnieńskie	135	27,6	348	69,2	1178	233,5

\* w opracowaniu technicznym brała udział p. Grażyna Dutkiewicz.

c.d. tab. I.

1	2	3	4	5	6	7
20. Legnickie	480	95,3	450	86,4	844	161,5
21. Leszczyńskie	290	76,0	544	138,3	173	43,8
22. Lubelskie	358	35,4	179	17,5	531	51,8
23. Łomżyńskie	81	23,4	187	53,0	98	27,7
24. M. łódzkie	563	49,5	836	74,1	2779	247,3
25. Nowosądeckie	413	59,9	1212	168,6	1228	169,6
26. Olsztyńskie	359	48,4	3961	518,3	1319	171,9
27. Opolskie	1857	182,5	971	94,6	1277	124,3
28. Ostrołęckie	191	48,5	334	82,5	355	87,4
29. Piłskie	194	40,5	1001	205,0	334	68,1
30. Piotrkowskie	384	59,8	592	91,8	695	107,8
31. Płockie	210	40,9	570	109,5	406	77,9
32. Poznańskie	1602	120,9	2244	167,0	1790	132,7
33. Przemyskie	93	22,9	962	233,5	159	38,5
34. Radomskie	179	24,0	1731	227,7	1674	219,7
35. Rzeszowskie	398	55,7	334	45,3	1727	232,9
36. Siedleckie	178	27,4	85	12,9	362	54,8
37. Sieradzkie	177	43,4	260	63,1	637	154,7
38. Skierniewickie	103	24,7	198	46,8	658	155,4
39. Słupskie	202	49,9	1340	317,2	1721	405,6
40. Suwalskie	444	96,5	1328	276,1	308	63,7
41. Szczecińskie	723	67,8	4017	408,5	2222	225,2
42. Tarnobrzeskie	556	92,6	1625	267,6	973	159,9
43. Tarnowskie	298	44,6	779	113,7	1318	191,4
44. Toruńskie	217	33,4	3229	484,8	2146	320,9
45. Wałbrzyskie	458	61,9	627	84,5	533	71,9
46. Włocławskie	183	42,7	276	63,7	2489	573,1
47. Wrocławskie	638	56,7	587	51,8	1003	88,3
48. Zamojskie	223	45,5	131	26,5	475	96,2
49. Zielonogórskie	296	45,1	1127	168,7	447	66,7

Hospitalizowano 131 osób (0,25% ogółu zachorowań na różyczkę). Nie zarejestrowano zgonów z powodu różyczki.

Sezonowy wzrost liczby zachorowań zarejestrowano od marca do czerwca. W okresie tym wystąpiło 61,8% ogółu zachorowań na różyczkę.

Analiza zachorowań na różyczkę w Polsce wykazała nieco wyższą ogólną zapadalność mężczyzn (144,2 na 100 000) niż kobiet (129,6). Podobnie jak w poprzednich latach najwyższa zapadalność dotyczyła dzieci w wieku 5-9 lat (804,0 na 100 000), a w tym dzieci siedmioletnich (1008,9 na 100 000). Zachorowania dzieci w wieku do 14 lat stanowiły 94,9% ogółu zachorowań na różyczkę (tab. II).

Wprowadzone w 1988 r. szczepienia przeciw różyczce dziewcząt w 13 roku życia znalazły odbicie w sytuacji epidemiologicznej. W grupie wieku 10-14 lat zapadalność dziewcząt jest nieco niższa niż chłopców, natomiast już w grupie 15-19 lat zapadalność dziewcząt (27,0) jest 2,3 raza niższa niż chłopców (61,6).

Tabela II. Różyczka w Polsce w 1994 r.

Zapadalność na 100 000 ludności i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapadal.	%	zapadal.	%	zapadal.	%
0-4	422,7	20,7	408,0	20,0	415,5	20,4
0	154,8	1,4	164,8	1,5	159,7	1,5
1	430,7	4,0	406,7	3,8	419,0	3,9
2	404,4	4,0	405,1	4,0	404,8	4,0
3	502,3	5,1	448,9	4,6	476,3	4,8
4	592,2	6,1	588,8	6,1	590,6	6,1
5-9	785,9	45,6	822,9	48,0	804,0	46,8
5	619,2	6,6	651,4	7,0	634,8	6,8
6	778,8	8,6	797,0	8,8	787,7	8,7
7	1004,1	11,5	1013,9	11,7	1008,9	11,6
8	835,2	10,1	894,9	10,9	864,4	10,5
9	688,7	8,7	748,3	9,6	717,9	9,1
10-14	451,3	28,5	413,9	26,8	433,0	27,7
15-19	61,6	3,7	27,0	1,6	44,7	2,7
20-24	10,3	0,5	16,6	0,9	13,4	0,7
25-29	4,6	0,4	18,7	0,9	11,6	0,5
30-34	5,3	0,3	17,7	0,9	11,4	0,6
35-39	2,8	0,2	9,7	0,6	6,2	0,4
40-44	1,3	0,1	3,6	0,2	2,5	0,1
45-49	0,9	0,0	1,6	0,1	1,2	0,1
50-54	0,1	0,0	1,2	0,0	0,7	0,0
55-59	0,6	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0
60 i >	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Ogółem	144,2	100,0	129,6	100,0	136,7	100,0

Tabela III. Różyczka w Polsce w 1994 r.

Zapadalność na 100 tys. ludności i podział procentowy według płci i środowiska.

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	181,5	155,4	86,1	86,0	144,2	129,6
%	51,8	48,2	50,0	50,0	51,3	48,7
Zapadalność na 100 000	167,9		86,1		136,7	
%	76,0		24,0		100,0	

M - mężczyźni;

K - kobiety

Tabela IV. Różyczka w Polsce w 1994 r.

Zapadalność na 100 000 ludności wg środowiska oraz liczby ludności w miastach.

Rok	Ogółem	Miasta					Wieś
		Razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
1993	166,5	190,4	264,3	207,6	211,3	148,9	128,0
1994	136,7	167,9	139,0	177,3	177,5	173,2	86,1

Ogólny współczynnik zapadalności na różyczkę w miastach (167,9) był 2-krotnie wyższy niż na wsi (86,1). Zachorowania w miastach stanowiły 76% ogółu zachorowań na różyczkę (tab. III). W przeciwieństwie do poprzedniego roku najwyższa zapadalność dotyczyła miast o liczbie mieszkańców powyżej 20 tysięcy (tab. IV).

W roku 1994 zaszczepiono przeciw różyczce 157476 dziewcząt w 13 r. życia (rocznik 1982). Dziewczęta urodzone w 1981 r. są zaszczepione w 93,2%, a urodzone w 1980 r. – w 96,4%.