

Halina Rudnicka, Lidia Brydak

GRYPA W 1995 ROKU*

W 1995 r. zarejestrowano w Polsce 1 122 916 zachorowań na grypę czyli 2,4 raza więcej niż w roku 1994. Najwyższą zapadalność zanotowano w województwie m. łódzkim (18 274,7 na 100 000) i warszawskim (13 816,3); wysoką w woj. leszczyńskim (7 822,7), wrocławskim (7 592,9), legnickim (6 102,0) i m. krakowskim (5 748,2). Najniższą zapadalność zarejestrowano w woj. chełmskim (6,8 na 100 000) oraz zapadalność poniżej 100 na 100 000 w województwach: białostockim, ciechanowskim, łomżyńskim, płockim, siedleckim i sieradzkim.

Zapadalność na grypę w skali całej Polski wyniosła 2 910,0 na 100 000 (tab. I). Zachorowania dzieci w wieku do 14 lat stanowiły, tak samo jak w roku 1994, 44% ogółu zachorowań na grypę (496 093 przypadki) a zapadalność wynosiła 6 094,9 na 100 000.

Hospitalizowano 364 osoby (0,03% ogółu przypadków) w tym 156 dzieci do 14 lat.

Tabela 1. Grypa w Polsce w latach 1994-1995 wg województw. Zachorowania, zapadalność na 100 000, liczba zgonów, umieralność na 100 000.

Województwo	1994				1995			
	liczba zachor.	zapadal. na 100 000	liczba zgonów	umieralność na 100 000	liczba zachor.	zapadal. na 100 000	liczba zgonów	umieralność na 100 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POLSKA	471 524	1 223,4	30	0,08	1 122 916	2 910,0	66	0,17
1. St. warszawskie	125 289	5 190,7	1	0,04	333 734	13 816,3	7	0,29
2. Białkopodlaskie	79	25,6	-	-	5 282	1 707,2	-	-
3. Białostockie	79	11,3	-	-	223	31,9	1	0,14
4. Bielskie	2 235	244,8	-	-	32 331	3 527,4	-	-
5. Bydgoskie	9 225	818,0	1	0,09	5 432	480,3	2	0,18
6. Chełmskie	43	17,2	-	-	17	6,8	-	-
7. Ciechanowskie	85	19,5	-	-	84	19,2	3	0,69
8. Częstochowskie	366	46,8	-	-	8 363	1 069,4	2	0,26
9. Elbląskie	110	22,5	-	-	1 104	224,8	-	-
10. Gdańskie	288	19,9	-	-	17 247	1 187,6	-	-
11. Gorzowskie	9 765	1 920,0	-	-	24 527	4 810,5	-	-
12. Jeleniogórskie	6 252	1 194,7	2	0,38	21 991	4 195,4	2	0,38

* W opracowaniu technicznym udział brały Panie Grażyna Dutkiewicz i Irena Chrześcijańska.

c.d. tab. I

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Kaliskie	192	26,6	-	-	14 003	1 940,7	1	0,14
14. Katowickie	3 626	91,7	3	0,08	28 084	714,1	7	0,18
15. Kieleckie	4 183	368,5	1	0,09	15 431	1 358,3	2	0,18
16. Konińskie	464	97,1	-	-	1 548	323,1	-	-
17. Koszalińskie	1 305	251,7	-	-	530	101,7	-	-
18. M. krakowskie	71	5,7	-	-	71 264	5 748,2	2	0,16
19. Krośnińskie	1 140	226,0	1	0,20	5 726	1 131,6	-	-
20. Legnickie	1 836	351,3	1	0,19	31 921	6 102,0	-	-
21. Leszczyńskie	3 552	900,0	-	-	31 027	7 822,7	-	-
22. Lubelskie	2 553	249,1	1	0,10	2 107	205,4	1	0,10
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	337	95,3	3	0,85
24. M. łódzkie	164 198	14 611,8	2	0,18	204 357	18 274,7	-	-
25. Nowosądeckie	1 491	205,9	-	-	1 566	214,4	5	0,69
26. Olsztyńskie	1 514	197,3	1	0,13	2 314	300,3	-	-
27. Opolskie	1 618	157,5	1	0,10	9 115	887,9	3	0,29
28. Ostrołęckie	174	42,8	-	-	1 402	343,7	-	-
29. Piłskie	1 400	285,3	-	-	17 243	3 498,8	-	-
30. Piotrkowskie	3 352	519,8	3	0,47	5 279	819,6	1	0,16
31. Płockie	304	58,3	-	-	142	27,2	-	-
32. Poznańskie	11 485	851,4	1	0,07	25 494	1 885,6	7	0,52
33. Przemyskie	739	179,0	2	0,48	532	128,5	1	0,24
34. Radomskie	36	4,7	-	-	2 626	344,2	1	0,13
35. Rzeszowskie	12	1,6	2	0,27	2 726	365,9	-	-
36. Siedleckie	480	72,7	-	-	503	76,0	-	-
37. Sieradzkie	1	0,2	1	0,24	133	32,3	1	0,24
38. Skierniewickie	741	175,0	-	-	677	159,8	-	-
39. Słupskie	452	106,5	-	-	2 644	621,5	2	0,47
40. Suwalskie	202	41,8	-	-	1 029	212,1	1	0,21
41. Szczecińskie	41 287	4 184,5	2	0,20	15 179	1 533,7	4	0,40
42. Tarnobrzeskie	1 492	245,2	-	-	2 308	378,9	1	0,16
43. Tarnowskie	243	35,3	1	0,15	34 581	4 999,8	4	0,58
44. Toruńskie	7 316	1 094,0	-	-	8 332	1 243,0	-	-
45. Wałbrzyskie	9 427	1 271,8	-	-	18 862	2 548,7	-	-
46. Włocławskie	58	13,4	-	-	687	158,0	-	-
47. Wrocławskie	45 437	4 000,9	3	0,26	86 351	7 592,9	2	0,18
48. Zamojskie	2 169	439,4	-	-	8 415	1 705,1	-	-
49. Zielonogórskie	3 158	471,1	-	-	18 106	2 689,9	-	-

W 1995 r. zarejestrowano 66 zgonów z powodu grypy. Śmiertelność wyniosła 0,006%. Większość zgonów – 58 (88%) wystąpiła w marcu, kwietniu i grudniu. Zmarły 34 kobiety i 32 mężczyzn. W miastach wystąpiło 25 zgonów a na wsi 41. Umieralność wyniosła 0,171 na 100 000 (w miastach 0,105 i na wsi 0,279). Najwyższą umieralność stwierdzono w woj. łomżyńskim (0,848). Zmarło jedno dziecko dwuletnie, jedno dziecko w grupie wieku 5-9 lat, 2 osoby w grupie wieku 40-44 lata oraz 62 osoby w wieku powyżej 60 lat.

W styczniu i w pierwszej połowie lutego w Zakładzie Wirusologii PZH wyizolowano 7 szczepów wirusa grypy, w tym: 3 szczepy wirusa grypy typu B spokrewnione z B/Beijing/184/93 i B/Lyon/87/93, 3 szczepy wirusa grypy A(H1N1) spokrewnione ze szczepami A/Texas/36/91 i A/Singapore/6/86 oraz 1 szczep wirusa A(H3N2) spokrewniony z A/Guangdong/25/93 i A/Johannesburg/33/94.

W drugiej połowie marca w WSSE w Krakowie izolowano 7 szczepów grypy B spokrewnionych z B/Qingdao/102/91.

Pod koniec roku w listopadzie w PZH wyizolowano 3 szczepy wirusa A(H1N1) spokrewnione z A/Singapore/6/86.

Ogółem w 1995 roku wyizolowano w Polsce 17 szczepów wirusa grypy, w tym jeden od 5-tygodniowego dziecka a pozostałe od osób dorosłych.