

Halina Rudnicka

## RÓŻYCZKA W 1995 ROKU\*

W 1995 roku liczba zachorowań na różyczkę utrzymywała się na poziomie z roku poprzedniego. Zarejestrowano 57 351 przypadków a zapadalność wyniosła 148,6 na 100 000 (tab. I).

Tabela I. Różyczka w Polsce w latach 1989-1995.

Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców wg województw.

Województwo	Mediana 1989-1993		1994		1995	
	zachorow.	zapadal.	zachorow.	zapadal.	zachorow.	zapadal.
1	2	3	4	5	6	7
<b>POLSKA</b>	59425	155,4	52 703	136,7	57 351	148,6
1. St. warszawskie	2028	83,9	1 351	56,0	1 527	63,2
2. Białkopodlaskie	172	56,4	159	51,4	47	15,2
3. Białostockie	318	45,8	629	89,9	365	52,1
4. Bielskie	488	54,7	947	103,7	570	62,2
5. Bydgoskie	1 555	139,7	2 953	261,9	1 068	94,4
6. Chełmskie	76	30,7	159	63,7	45	18,0
7. Ciechanowskie	381	88,8	190	43,7	308	70,6
8. Częstochowskie	1 258	160,9	1 492	190,8	1 086	138,9
9. Elbląskie	311	65,4	571	116,7	1 243	253,1
10. Gdańskie	1 249	87,1	1 696	117,1	1 096	75,5
11. Gorzowskie	890	177,5	301	59,2	684	134,2
12. Jeleniogórskie	367	70,9	522	99,7	2 107	402,0
13. Kaliskie	439	61,1	660	91,6	432	59,9
14. Katowickie	5 475	138,4	3 797	96,0	8 951	227,6
15. Kieleckie	855	75,9	1 827	160,9	389	34,2
16. Konińskie	248	52,8	176	36,8	324	67,6
17. Koszalińskie	1 129	219,0	944	182,1	1 381	265,1
18. M. krakowskie	1 147	93,8	2 470	199,7	874	70,5
19. Krośnieńskie	154	31,2	1 178	233,5	477	94,3
20. Legnickie	450	86,4	844	161,5	663	126,7
21. Leszczyńskie	544	138,3	173	43,8	301	75,9
22. Lubelskie	358	35,4	531	51,8	208	20,3
23. Łomżyńskie	85	24,6	98	27,7	103	29,1
24. M. łódzkie	836	74,1	2 779	247,3	8 837	790,3

\* W opracowaniu technicznym brała udział pani Grażyna Dutkiewicz.

c.d. tab. I

1	2	3	4	5	6	7
25. Nowosądeckie	929	132,6	1 228	169,6	725	99,3
26. Olsztyńskie	519	68,7	1 319	171,9	1 222	158,6
27. Opolskie	1 857	182,5	1 277	124,3	1 747	170,2
28. Ostrołęckie	191	48,5	355	87,4	1 433	351,3
29. Piłskie	467	96,9	334	68,1	1 201	243,7
30. Piotrkowskie	592	91,8	695	107,8	2 169	336,7
31. Płockie	353	68,2	406	77,9	860	164,8
32. Poznańskie	2 244	167,0	1 790	132,7	4 922	364,0
33. Przemyskie	133	32,9	159	38,5	135	32,6
34. Radomskie	190	25,3	1 674	219,7	611	80,1
35. Rzeszowskie	398	55,7	1 727	232,9	258	34,6
36. Siedleckie	178	27,4	362	54,8	196	29,6
37. Sieradzkie	260	63,1	637	154,7	208	50,4
38. Skierniewickie	120	28,6	658	155,4	754	178,0
39. Słupskie	610	146,9	1 721	405,6	858	201,7
40. Suwalskie	538	115,7	308	63,7	110	22,7
41. Szczecińskie	2 559	262,8	2 222	225,2	1 084	109,5
42. Tarnobrzесьkie	575	96,6	973	159,9	366	60,1
43. Tarnowskie	334	50,3	1 318	191,4	574	83,0
44. Toruńskie	241	36,8	2 146	320,9	1 022	152,5
45. Wałbrzyskie	627	84,5	533	71,9	641	86,6
46. Włocławskie	276	63,7	2 489	573,1	216	49,7
47. Wrocławskie	596	52,9	1 003	88,3	2 198	193,3
48. Zamojskie	223	45,5	475	96,2	72	14,6
49. Zielonogórskie	465	70,3	447	66,7	683	101,5

Najwyższą zapadalność zanotowano w województwie m. łódzkim (790,3). Wysoką zapadalność (powyżej 300 na 100 000) wykazały też województwa: jeleniogórskie, ostrołęckie, piotrkowskie i poznańskie. Najniższą zapadalność miało województwo zamojskie (14,6) oraz białkopodlaskie (15,2).

Hospitalizowano 158 osób (0,28% ogółu zachorowań na różyczkę). Zarejestrowano 1 zgon dwuletniej dziewczynki zamieszkałej w mieście, w województwie białostockim.

Sezonowy wzrost liczby zachorowań zarejestrowano od marca do czerwca. W okresie tym wystąpiło 66,5% ogółu zachorowań na różyczkę.

Analiza zachorowań na różyczkę w Polsce wykazała nieco wyższą ogólną zapadalność mężczyzn (157,6) niż kobiet (140,1). Podobnie jak w poprzednich latach najwyższą zapadalność dotyczyła dzieci w wieku 5-9 lat (950,5 na 100 000) w tym dzieci siedmioletnich (1185,4 na 100 000). Zachorowania dzieci w wieku do 14 lat stanowiły 94,8% ogółu zachorowań na różyczkę (tab. II).

W grupie wieku 10-14 lat zapadalność dziewcząt była nieco niższa (433,3) niż chłopców (491,6). Różnica ta zwiększyła się znacznie w grupie 15-19 lat - zapadalność dziewcząt była 4,1 raza niższa niż chłopców (w roku 1994 - 2,3 raza). Wpływ na tę sytuację epidemiologiczną mają szczepienia dziewcząt. We wszystkich starszych grupach wieku zapadalność kobiet jest wyższa od zapadalności mężczyzn.

Tabela II. Różyczka w Polsce w 1995 r. Zapadalność na 100000 ludności i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapadal.	%	zapadal.	%	zapadal.	%
0-4	422,9	18,2	437,4	19,1	430,0	18,7
0	160,6	1,3	164,4	1,3	162,5	1,3
1	380,4	3,2	398,7	3,4	389,3	3,3
2	400,7	3,4	413,1	3,6	406,8	3,5
3	485,0	4,3	475,4	4,4	480,3	4,4
4	640,6	6,0	686,3	6,4	662,9	6,2
5-9	923,9	47,0	978,4	50,5	950,5	48,8
5	768,1	7,3	791,9	7,6	779,7	7,4
6	888,8	8,7	933,9	9,2	910,8	9,0
7	1 144,3	11,6	1 228,8	12,6	1 185,4	12,2
8	968,4	10,1	1 027,3	10,9	997,2	10,5
9	843,8	9,3	901,5	10,2	872,1	9,7
10-14	491,6	28,7	433,3	25,8	463,1	27,3
15-19	84,6	4,7	20,7	1,2	53,3	3,0
20-24	13,7	0,7	15,9	0,8	14,8	0,7
25-29	7,8	0,3	22,4	1,0	15,0	0,6
30-34	5,0	0,2	17,8	0,8	11,3	0,5
35-39	3,0	0,2	8,5	0,5	5,7	0,3
40-44	0,8	0,0	3,9	0,2	2,4	0,1
45-49	0,6	0,0	1,4	0,1	1,0	0,0
50-54	0,2	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0
55-59	0,3	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0
60i>	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Ogółem	157,6	51,6	140,1	48,4	148,6	100,0

Tabela III. Różyczka w Polsce w 1995 r. Zapadalność na 100 tys. ludności i podział procentowy według płci i środowiska.

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	202,8	171,8	87,4	86,6	157,6	140,1
%	40,4	37,3	11,2	11,1	51,6	48,4
Zapadalność na 100 000	186,6		87,0		148,6	
%	77,7		22,3		100,0	

M - mężczyźni K - kobiety

Tabela IV. Różyczka w Polsce w 1995 r. Zapadalność na 100 000 ludności wg środowiska oraz liczby ludności w miastach.

Rok	Ogółem	Miasta					Wieś
		Razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
1994	136,7	167,9	139,0	177,3	177,5	173,2	86,1
1995	148,6	186,6	176,3	209,9	267,0	158,6	87,0

Ogólny współczynnik zapadalności na różyczkę w miastach (186,6) był 2-krotnie wyższy niż na terenach wiejskich (87,0). Zachorowania w miastach stanowiły 77,7% ogółu zachorowań na różyczkę (tab. III). Najwyższa zapadalność dotyczyła miast o liczbie mieszkańców od 50 do 100 000 (tab. IV).

W roku 1995 zaszczepiono przeciw różyczce 190 420 dziewcząt w 13 r. życia (rocznik 1983). Dziewczęta urodzone w 1982 r. są zaszczepione w 94,3%, a urodzone w 1981 r. – w 96,9%.