

Wanda Szata

AIDS I ZAKAŻENIE HIV W 1996 ROKU*

W 1996 r. w Polsce odnotowano 105 zachorowań na AIDS. Liczba ta była mniejsza niż w 1995 r. o 9 zachorowań (7,9%) lecz większa od mediany za lata 1990-1994 o 59 (128,3%). Zapadalność wynosiła 0,3 na 100 000 mieszkańców; była analogiczna jak zapadalność w 1995 r. lecz trzykrotnie przewyższała medianę za lata 1990-1994 (0,1).

Prawie jedną trzecią (36) liczby zachorowań rozpoznanych w 1996 r. zgłoszono z opóźnieniem – do końca kwietnia 1997 r. Ponadto w 1997 r. zgłoszono z opóźnieniem jedno zachorowanie rozpoznane w 1994 r. i dwa w 1995 r.

U chorych, u których rozpoznano AIDS w 1996 r., określono następujące choroby wskaźnikowe: kandydozę przełyku – u 30 osób, zespół wyniszczenia w przebiegu zakażenia HIV – u 21, zapalenie płuc wywołane przez *Pneumocystis carinii* – u 14, gruźlicę płuc – u 12, nawracające zapalenie płuc – u 10, encefalopatię związaną z zakażeniem HIV – u 9 oraz gruźlicę pozapłucną – u 8 osób.

Ponadto rozpoznano:

- pięciokrotnie: zapalenie siatkówki wywołane przez wirus cytomegalii i toksoplazmozę mózgu;
- czterokrotnie – przewlekłe owrzodzenie wywołane przez *Herpes simplex*;
- trzykrotnie: pozapłucną kryptokokozę, chorobę wywołaną wirusem cytomegalii oraz mykobakteriozy inne niż wywołane przez *M. tuberculosis*, *M. avium complex* lub *M. kansasii*;
- dwukrotnie: kandydozę oskrzeli, tchawicy lub płuc, zmiany rozsiane lub pozapłucne wywołane przez *M. avium complex*, nawracającą posocznicę wywołaną przez bakterie z rodzaju *Salmonella* (poza wywołującymi dur brzuszny i dury rzekome), mięsaka Kaposiego oraz chłoniaka Burkitta;
- jednokrotnie: zakażenia bakteryjne, liczne lub nawracające u dziecka w wieku poniżej 13 lat, postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię, chłoniaka immunoblastycznego i chłoniaka bliżej nieokreślonego.

W 1996 roku w 62 przypadkach AIDS podano liczbę komórek CD4. U 16 chorych była ona niższa od 50/ μ L, u 29 wynosiła od 50 do 199, u 12 – od 200 do 499, u 5 – równa lub większa od 500, a maksymalna – 2061/ μ L.

Wśród chorych z AIDS rozpoznanych w 1996 r. przeważali narkomani (51 osób; 48,6% ogółu chorych) (tab. I); dwudziestu czterech chorych zakażyło się drogą kontaktów homo-/biseksualnych, piętnastu drogą kontaktów heteroseksualnych, a pozostałe piętnaście osób to: troje dzieci, dwóch chorych na hemofilię i dziesięć osób bez informacji o drodze zakażenia.

* uzupełniane do listopada 1997 r. włącznie

Tabela I. Liczba zachorowań* i zgonów** chorych na AIDS w Polsce w latach 1986-1996 wg drogi przenoszenia zakażenia

Rok	Zachorowania						Zgony					
	H-/Bi	N	He	I	Bd	ogółem	H-/Bi	N	He	I	Bd	ogółem
1986	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
1987	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	2
1988	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2
1989	17	6	1	-	-	24	11	3	-	-	-	14
1990	13	5	3	-	-	21	8	1	3	-	-	12
1991	16	24	4	1	1	46	9	3	-	-	1	13
1992	12	19	2	2	-	35	13	11	4	-	-	28
1993	21	32	11	3	1	68	13	14	4	2	1	34
1994	29	48	12	5	4	98	24	17	6	3	4	54
1995	27	53	20	4	10	114	18	37	15	3	5	78
1996	24	51	15	5	10	105	17	35	10	3	8	73
Razem	163	238	69	20	26	516	117	121	43	11	19	311

* wg roku rozpoznania; ** - wg daty zgonu;

H-/Bi - homo- i biseksualiści, N - zakażeni w związku ze stosowaniem środków odurzających, He - zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych, I - inni, Bd - brak danych

Zarejestrowano zachorowania 83 mężczyzn i 22 kobiet. Wiek chorych kształtował się następująco: troje dzieci (siedmio-, ośmiomiesięczne i niespełna półtoraroczne), dziesięć nastolatków, 20-29 lat - 26 osób, 30-39 - 44 osoby, 40-49 - 25, 50-59 - 4 oraz dwie osoby w wieku 60 i 62 lata.

W 1996 r. odnotowano zachorowania na AIDS w 27 województwach. Liczba zachorowań mieściła się w granicach od jednego - w dziesięciu województwach, do 28 (26,7% ogółu) - w woj. st. warszawskim (tab. III). Ponadto m.in. w woj. katowickim wystąpiło 12 zachorowań, gdańskim - 10 i w bydgoskim - 9. W poszczególnych województwach, w których zarejestrowano AIDS, zapadalność wahała się od 0,1 (w sześciu województwach) do 1,2 na 100 000 mieszkańców w woj. st. warszawskim.

Tabela II. Zachorowania na AIDS w Polsce w latach 1986-1996.

Podział wg płci, wieku* i drogi przenoszenia zakażenia

Wiek* (lata)	Płeć			Droga przenoszenia zakażenia					
	M	K	ogółem	H-/Bi	N	He	I	Bd	ogółem
< 20	7	4	11		2		9		11
20-29	96	35	131	18	93	12	5	3	131
30-39	198	27	225	66	120	26	2	11	225
40-49	97	6	103	49	23	19	3	9	103
50-59	29	4	33	21		11		1	33
≥ 60	12	1	13	9		1	1	2	13
Razem	439	77	516	163	238	69	20	26	516

* dokładny wiek (lata) w chwili rozpoznania AIDS;

M - mężczyźni, K - kobiety, H-/Bi - homo- i biseksualiści, N - zakażeni w związku ze stosowaniem środków odurzających, He - zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych, I - inni, Bd - brak danych.

W 1996 r. zarejestrowano ogółem 73 zgony chorych na AIDS. Była to liczba mniejsza od liczby zgonów w 1995 r. o 5 (6,4%), lecz większa od mediany za lata 1990-1994 o 45 (160,7%). Prawie połowę (48,0%) liczby zmarłych stanowili narkomani. W 1996 r. umieralność wynosiła 0,2 na 100 000 mieszkańców i była analogiczna jak umieralność w 1995 r.

Zgony chorych na AIDS odnotowano w 24 województwach. Liczba zgonów wahała się od jednego (w 13 województwach) do 22 w woj. st. warszawskim. Najwyższa była umieralność w woj. st. warszawskim (0,9), a ponadto w woj. bydgoskim, szczecińskim i jeleniogórskim (odpowiednio: 0,8, 0,7 i 0,6 na 100 000 mieszkańców).

AIDS W LATACH 1986-1996

Od rozpoczęcia rejestracji do 31 grudnia 1996 r. rozpoznano w Polsce i zgłoszono do Zakładu Epidemiologii PZH ogółem 516 zachorowań na AIDS. Mieściły się one w następujących kategoriach: zakażenie /-a oportunistyczne – u 430 osób, mięsak Kaposiego – u 9, zakażenie /-a oportunistyczne i mięsak Kaposiego – u 7, chłoniak – u 8, encefalopatia związana z zakażeniem HIV – u 24, zespół wyniszczenia w przebiegu zakażenia HIV – u 37 osób oraz rak inwazyjny szyjki macicy – u 1 osoby.

Wśród 516 chorych z AIDS rozpoznanych w latach 1986-1996 najczęściej było narkomanów i znaczną grupę stanowili homo- i biseksualiści (odpowiednio: 46,1% i 31,6% ogółu); 13,4% ogółu chorych stanowili zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych. Wśród ogółu chorych przeważali mężczyźni (85,1%) (tab. II), osoby w wieku 30-39 lat (43,6%) oraz osoby mieszkające na stałe w woj. st. warszawskim (32,6%) (tab. III).

Tabela III. AIDS w Polsce w latach 1986-1996.

Zachorowania, zapadalność, zgony i umieralność. Podział wg województw*

Województwo	Zachorowania							Zgony						
	Mediana 1990-1994		1995		1996		1986-1996	Mediana 1990-1994		1995		1996		1986-1996
	l.	zap.	l.	zap.	l.	zap.	l.	l.	um.	l.	um.	l.	um.	l.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POLSKA	46	0,1	114	0,3	105	0,3	516	28	0,1	78	0,2	73	0,2	311
1. St. warszawskie	18	0,7	24	1,0	28	1,2	168	8	0,3	18	0,8	22	0,9	101
2. Białkopodlaskie	0	0,0	1	0,3	-	-	2	-	-	1	0,3	-	-	1
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	1	0,1	2	0,2	3	0,3	10	1	0,1	2	0,2	2	0,2	7
5. Bydgoskie	3	0,3	5	0,4	9	0,8	30	1	0,1	4	0,3	9	0,8	19
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	0	0,0	-	-	-	-	1	0	0,0	-	-	-	-	1
8. Częstochowskie	-	-	1	0,1	1	0,1	2	-	-	-	-	1	0,1	1
9. Elbląskie	1	0,2	1	0,2	2	0,4	6	0	0,0	-	-	1	0,2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10. Gdańskie	2	0,1	16	1,1	10	0,7	46	2	0,1	10	0,7	5	0,3	26
11. Gorzowskie	-	-	1	0,2	2	0,4	3	-	-	1	0,2	-	-	1
12. Jeleniogórskie	0	0,0	3	0,6	1	0,2	11	0	0,0	4	0,8	3	0,6	9
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14. Katowickie	2	0,1	17	0,4	12	0,3	51	2	0,1	11	0,3	4	0,1	30
15. Kieleckie	0	0,0	-	-	1	0,1	4	0	0,0	-	-	1	0,1	4
16. Konińskie	-	-	1	0,2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	0	0,0	2	0,4	3	0,6	6	0	0,0	1	0,2	-	-	2
18. M. krakowskie	-	-	-	-	1	0,1	1	-	-	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	0	0,0	3	0,6	1	0,2	6	-	-	2	0,4	1	0,2	3
21. Leszczyńskie	0	0,0	2	0,5	2	0,5	5	-	-	2	0,5	2	0,5	4
22. Lubelskie	0	0,0	3	0,3	2	0,2	7	0	0,0	2	0,2	1	0,1	5
23. Łomżyńskie	0	0,0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
24. M. łódzkie	2	0,2	3	0,3	3	0,3	19	2	0,2	-	-	2	0,2	14
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	0	0,0	-	-	1	0,1	2	-	-	-	-	1	0,1	1
27. Opolskie	1	0,1	1	0,1	1	0,1	8	0	0,0	1	0,1	1	0,1	3
28. Ostrołęckie	0	0,0	-	-	-	-	2	0	0,0	-	-	-	-	1
29. Piłskie	0	0,0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	3	0,5	1	0,2	4	-	-	3	0,5	-	-	3
31. Płockie	0	0,0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	3	0,2	2	0,2	6	0	0,0	3	0,2	2	0,2	6
33. Przemyskie	0	0,0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
34. Radomskie	1	0,1	1	0,1	1	0,1	11	1	0,1	2	0,3	1	0,1	7
35. Rzeszowskie	0	0,0	-	-	-	-	1	0	0,0	-	-	-	-	1
36. Siedleckie	1	0,2	5	0,8	2	0,3	14	0	0,0	3	0,4	1	0,2	6
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	0	0,0	2	0,5	-	-	3	0	0,0	-	-	1	0,2	2
39. Słupskie	-	-	2	0,5	-	-	3	-	-	1	0,2	-	-	2
40. Suwalskie	0	0,0	-	-	-	-	2	0	0,0	-	-	-	-	1
41. Szczecińskie	0	0,0	6	0,6	6	0,6	18	0	0,0	-	-	7	0,7	11
42. Tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
43. Tarnowskie	0	0,0	-	-	-	-	2	0	0,0	-	-	-	-	1
44. Toruńskie	1	0,2	1	0,1	1	0,2	8	0	0,0	-	-	2	0,3	5
45. Wałbrzyskie	0	0,0	-	-	3	0,4	6	0	0,0	1	0,1	1	0,1	4
46. Włocławskie	0	0,0	-	-	-	-	1	0	0,0	-	-	-	-	1
47. Wrocławskie	3	0,3	3	0,3	3	0,3	26	1	0,1	4	0,3	1	0,1	16
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	1	0,2	2	0,3	3	0,5	13	0	0,0	2	0,3	1	0,2	6

* rejestrowanie wg adresu stałego miejsca zamieszkania;

l - liczba, zap. - zapadalność na 100 000 mieszkańców; um. - umieralność na 100 000 mieszkańców;

0 - wystąpiły zachorowania lub zgony

W latach 1986–1996 stwierdzono AIDS u 77 kobiet. Najwięcej z nich (47) zakażyło się w związku ze stosowaniem środków odurzających, 19 – drogą kontaktów heteroseksualnych, a ponadto były wśród nich: trzy dziewczynki z matek zakażonych HIV, dwie biorczynie krwi, jedna kobieta biseksualna i pięć bez informacji o drodze zakażenia.

Kobiety były młodsze od mężczyzn, a narkomani młodszy od homo- i biseksualistów.

W latach 1986–1996 odnotowano AIDS w większości województw (43). Najwięcej zachorowań zarejestrowano w woj. st. warszawskim – 168, a ponadto m.in.: 51 – w woj. katowickim, 46 – w gdańskim, 30 – w bydgoskim i 26 – we wrocławskim; w 10 województwach zarejestrowano po jednym zachorowaniu.

W latach 1986 do 1996 zgłoszono ogółem z 38 województw 311 zgonów chorych na AIDS. Liczba zgonów w poszczególnych województwach wahała się od jednego (w 13 województwach) do 101 w woj. st. warszawskim; 30 zgonów zarejestrowano w woj. katowickim, 26 w gdańskim i 19 w bydgoskim.

Wśród zmarłych zbliżony i wysoki odsetek stanowili narkomani i homo-/biseksualiści (odpowiednio: 38,9% i 37,6%).

W latach 1986–1996 w 38,8% ogółu zachorowań na AIDS stwierdzono odstęp powyżej 3 lat między wykryciem zakażenia HIV a rozpoznaniem AIDS (tab. IV). W 1996 r. odsetek (54,3%) chorych o tak długim okresie przed rozpoznaniem AIDS był większy niż we wszystkich pozostałych latach.

Tabela IV. AIDS w latach 1986–1996. Podział wg roku rozpoznania AIDS oraz czasu między stwierdzeniem zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

Rok rozpoznania AIDS	Czas między stwierdzeniem zakaż. HIV i zachor. na AIDS				
	rozpoznanie równoczesne	poniżej 1 roku	rok do 3 lat	powyżej 3 lat	ogółem
1986–1988	5	–	–	–	5
1989	13	4	5	2	24
1990	8	9	3	1	21
1991	5	20	19	2	46
1992	5	11	10	9	35
1993	13	15	13	27	68
1994	18	10	26	44	98
1995	24	18	14	58	114
1996	24	15	9	57	105
Razem	115	102	99	200	516

U zdecydowanej większości (79,1%) spośród 311 chorych na AIDS, którzy zmarli w latach 1986–1996, rozpoznano ten zespół w chwili zgonu lub przeżyli oni – od rozpoznania AIDS do zgonu – okres krótszy niż 1 rok. Pozostałe osoby (65) żyły po rozpoznaniu AIDS rok lub dłużej. Większość z nich (45 osób) zmarła w ciągu dwu lat od postawienia rozpoznania. Najpóźniej – po sześciu latach – zmarł biseksualny mężczyzna, który w chwili rozpoznania AIDS miał 47 lat; obecność przeciwciał anty-HIV stwierdzono u niego na rok przed rozpoznaniem AIDS.

ZAKAŻENIA HIV W 1996 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 1996 r. u obywateli polskich wykonano ogółem 1 190 140 badań przesiewowych w kierunku przeciwciał anti-HIV tj. o 87 500 mniej niż w 1995 r. (tab. V). Zbadano zbliżoną liczbę osób z następujących grup: homo-/biseksualiści, stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach, osoby trudniące się prostytutką oraz chorzy na hemofilię (1996 r. – 8 017, 1995 r. – 7 723). Odnotowanie w 1996 r. kilkakrotnie większej liczby badań wykonanych u biorców krwi, nasienia, tkanek i narządów jest związane z włączeniem się CSK WAM do grupy placówek sprawozdających liczbę wykonanych badań w kierunku przeciwciał anti-HIV; CSK WAM poinformował o przeprowadzeniu wśród biorców 31 800 badań.

Tabela V. Nowo wykryte zakażenia HIV w 1996 r.

Grupa badanych	Liczba badań ogółem	W tym serologicznie dodatnich*	
		Liczba osób	Częstość**
Homo- i biseksualiści	476	39	8,2
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach	6 910	343	5,0
Osoby trudniące się prostytutką	474	1	0,2
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	38 146	–	–
Chorzy na hemofilię	157	–	–
Osoby z ww. grup – razem	46 163	383	0,8
Dawcy krwi***	953 350	16	0,002
Dawcy krwi****	42 635	.	.
Inni/brak danych	147 792	152	.
Obywatele polscy ogółem	1 190 140	551	0,05
Obcokrajowcy	1 394	10	0,7

* bez MSW, PKP;

** liczba osób serologicznie dodatnich na 100 wykonanych badań;

*** wg danych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii;

**** wg danych CSK WAM

W 1996 r. do Zakładu Epidemiologii PZH zgłoszono nowo wykryte zakażenie HIV 551 obywateli polskich – o 12 (2,2%) więcej niż w roku 1995. Wśród nich nadal przeważali zakażeni w związku ze stosowaniem środków odurzających (343 osoby, 62,3% ogółu zakażonych). Było ich więcej niż w 1995 r. o 23 osoby tj. o 7,2%. Nadal pozostawał wysoki odsetek osób bez informacji o drodze zakażenia (24,5% ogółu nowo wykrytych zakażeń). Ponadto wiadomo m.in., że co najmniej 17 osób uległo zakażeniu drogą kontaktów heteroseksualnych.

W 1996 r. (tab. V) liczba nowo wykrytych zakażeń na 100 wykonanych badań w kierunku przeciwciał anti-HIV, przeprowadzonych zarówno wśród zakażonych w związku ze stosowaniem środków odurzających jak i wśród homo- i biseksualistów była większa niż w 1995 r., a w drugiej z tych grup – najwyższa w dotychczasowej obserwacji.

W 1996 r. wśród nowo wykrytych zakażonych osób nadal większość stanowili mężczyźni – 75,1% ogółu zakażonych, 3,2 w proporcji mężczyźni na 1 kobietę; (414 mężczyzn, 128 kobiet, 9 osób bez informacji o płci). Różnica ta była zbliżona do odnotowanej w 1995 r.

Kobiety, u których w 1996 r. rozpoznano zakażenie HIV, w większości przypadków uległy zakażeniu w związku ze stosowaniem środków odurzających (78; 60,9% ogółu zakażonych kobiet). Ponadto było: 6 zakażonych drogą kontaktów heteroseksualnych, dwoje dzieci i kobieta trująca się prostytutką; o 40 kobietach brak informacji o drodze zakażenia.

W 1996 r. wśród zakażonych HIV nadal przeważały osoby młode, w wieku 20–29 lat (275 osób, 49,9% ogółu zakażonych). W pozostałych grupach wieku było: do 20 lat – 54 osoby (dwoje dzieci w trzecim roku życia oraz 15–19-latk), 30–39 lat – 141, 40–49 lat – 46, 50–59 – 13 i 60 lub więcej lat – 6 osób; brak informacji o wieku 16 osób. Zakażone kobiety były młodsze niż mężczyźni; wśród kobiet 21,2% miało poniżej 20 lat.

W 1996 r. zgłoszono podejrzenie zakażenia HIV (wykryto przeciwciała anti-HIV) u dwanaścioro dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy.

Serologicznie dodatnie osoby, u których wykryto zakażenie HIV w 1996 r. miały miejsce zamieszkania na terenie 43 województw (tab. VI). Najwięcej nowo wykrytych zakażeń odnotowano w woj. st. warszawskim (64), a ponadto m.in. w katowickim, szczecińskim i wrocławskim (odpowiednio: 60, 35 i 29). U 104 osób (18,9%) brak informacji o miejscu zamieszkania.

Tabela VI. Nowo wykryte zakażenia HIV obywateli polskich – 1996 r.; podział wg województw* i grup zakażonych

Województwo	Grupa zakażonych							Razem		
	H-/Bi	N	D	P	He	Dz	Bd	liczba	%	liczba na 100 tys. mieszkań.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem	39	343	16	1	17	1	134	551	100,0	1,4
1. St. warszawskie	18	24	2	–	3	–	17	64	11,6	2,7
2. Białkopodlaskie	–	–	–	–	–	–	1	1	0,2	0,3
3. Białostockie	–	20	3	–	–	–	1	24	4,4	3,4
4. Bielskie	–	10	–	–	1	–	2	13	2,4	1,4
5. Bydgoskie	–	3	1	–	–	–	2	6	1,1	0,5
6. Chełmskie	–	–	–	–	–	–	2	2	0,4	0,8
7. Ciechanowskie	–	2	–	–	–	–	1	3	0,5	0,7
8. Częstochowskie	–	2	–	–	–	–	–	2	0,4	0,3
9. Elbląskie	1	3	–	–	–	–	–	4	0,7	0,8
10. Gdańskie	–	5	–	–	–	–	2	7	1,3	0,5
11. Gorzowskie	–	2	–	–	1	–	–	3	0,5	0,6
12. Jeleniogórskie	1	4	1	–	–	–	1	7	1,3	1,4
13. Kaliskie	–	10	–	–	–	–	–	10	1,8	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. Katowickie	-	48	2	-	-	-	10	60	10,9	1,5
15. Kieleckie	-	1	-	-	-	-	-	1	0,2	0,1
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	1	1	0,2	0,2
17. Koszalińskie	3	1	-	-	-	-	-	4	0,7	0,8
18. M. krakowskie	-	2	-	-	-	-	1	3	0,5	0,2
19. Krośnieńskie	-	2	-	-	-	-	1	3	0,5	0,6
20. Legnickie	-	7	-	-	2	-	2	11	2,0	2,1
21. Leszczyńskie	-	2	-	-	-	-	1	3	0,5	0,8
22. Lubelskie	-	16	1	-	-	-	6	23	4,2	2,2
23. Łomżyńskie	-	1	-	-	-	-	3	4	0,7	1,1
24. M. łódzkie	4	13	-	-	2	-	3	22	4,0	2,0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	2	-	-	-	-	2	4	0,7	0,5
27. Opolskie	-	8	-	-	-	-	2	10	1,8	1,0
28. Ostrołęckie	-	1	-	-	-	-	2	3	0,5	0,7
29. Piłskie	-	1	-	-	1	-	1	3	0,5	0,6
30. Piotrkowskie	1	21	-	-	-	-	2	24	4,4	3,7
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	2	4	-	-	1	-	4	11	2,0	0,8
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	2	-	-	-	-	-	2	0,4	0,3
35. Rzeszowskie	-	1	1	-	-	-	-	2	0,4	0,3
36. Siedleckie	-	-	-	-	1	-	-	1	0,2	0,2
37. Sieradzkie	-	2	-	-	-	-	-	2	0,4	0,5
38. Skierniewickie	1	1	-	-	-	-	-	2	0,4	0,5
39. Słupskie	-	1	-	-	1	-	-	2	0,4	0,5
40. Suwalskie	-	1	-	-	-	-	-	1	0,2	0,2
41. Szczecińskie	2	24	3	-	-	-	6	35	6,3	3,5
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	2	-	-	-	-	1	3	0,5	0,5
45. Wałbrzyskie	1	7	1	-	-	-	1	10	1,8	1,4
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	1	20	1	-	-	-	7	29	5,3	2,6
48. Zamojskie	-	3	-	-	-	-	1	4	0,7	0,8
49. Zielonogórskie	-	17	-	-	-	-	1	18	3,3	2,7
Brak danych	4	47	-	1	4	1	47	104	18,9	×

* rejestrowanie wg stałego miejsca zamieszkania; H-/Bi - homo- i biseksualiści; N - zakażeni HIV w związku z stosowaniem środków odurzających; D - kandydaci na krwiodawców; P - osoby trudniące się prostytutką; He - zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych, Dz - dzieci; Bd - brak danych;

** ludność - stan w dniu 30.06.1996 r., dane GUS

Liczba nowo wykrytych zakażeń na 100 000 mieszkańców wynosiła w Polsce 1,4 – analogicznie jak w roku 1995. W poszczególnych województwach z odnotowanymi zakażeniami wahała się od 0,1 w woj. kieleckim do 3,7 w woj. piotrkowskim, a ponadto wynosiła m.in. 3,5 w woj. szczecińskim i 3,4 w woj. białostockim. Była równa przeciętnej ogólnopolskiej lub wyższa od niej w czternastu województwach, w tym w grupie województw Polski południowo-zachodniej.

PODSUMOWANIE

W 1996 r. w Polsce odnotowano stabilizację liczby zachorowań na AIDS i liczby zgonów chorych na AIDS. Aczkolwiek trudno wykluczyć wpływ niepełnego zgłoszenia, wynikły z ogólnopolskiej akcji protestacyjnej lekarzy, stabilizację liczby zachorowań na AIDS, a także spadek zapadalności zaobserwowano w wielu krajach Europy i wśród chorych na AIDS zakażonych HIV różnymi drogami.

Na niektórych obszarach Polski wystąpił wzrost częstości względnej nowo wykrytych zakażeń, związany z szerzeniem się zakażenia HIV w środowiskach osób stosujących środki odurzające we wstrzyknięciach, mieszkających w małych miastach.